

FICHA TÉCNICA

Scalibor collar.

Deltametrina
Collar
Uso externo.

COMPOSICIÓN: Deltametrina 4%.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: **Perro:** Prevención de las infestaciones por garrapatas y pulgas durante 6 y 4 meses, respectivamente. Scalibor collar tiene un efecto repelente (antialimentación) para los *Phlebotomus* spp, por lo que puede utilizarse como parte de un programa de prevención frente a la leishmaniosis, y para los mosquitos culícidos del complejo *Culex pipiens*.

POSOLÓGIA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Uso externo: 1 collar/animal.

Ajustar el collar, sin apretar alrededor del cuello del animal. Cortar el exceso de collar dejando 5 cm tras el pasador.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna.

PRECAUCIONES: No utilizar el collar en animales con lesiones cutáneas extensas. No usar en animales menores de 7 semanas de edad. El collar empieza a ser efectivo una semana después de su colocación en el perro. Lavarse las manos con jabón y agua fría tras manipular el collar. Mantener fuera del alcance de los niños. No permitir que los niños jueguen con el collar o lo chupen. Mantener lejos de bebidas, alimentos y piensos. Mantener el envoltorio bien cerrado hasta el momento del empleo. La deltametrina es tóxica para los peces y las abejas. Después de usar el collar no debe tirarse en el medio ambiente ni en el agua.

Uso veterinario

Instrucciones completas en el prospecto.

No sujeto a prescripción veterinaria.

Presentaciones: Collar 48 cm; Collar 65 cm.

Reg N°: 1326 ESP.

Laboratorios Intervet S.A.
Polig. El Montalvo parcela 39
Apartado 3006
37080 Salamanca